内吞蛋白家族的研究近况*

吴兴中

(复旦大学上海医学院生物化学与分子生物学系 上海 20032)

摘要 内吞蛋白是最近发现的一类功能蛋白质,主要参与细胞膜的物质运输和信息交流。内吞蛋白具有特殊的结构,家族成员之间有很高的同源性,成员蛋白一般多具有C端的SH3结构域和N端的溶血磷脂酸脂酰基转移酶结构域。C端的SH3结构域可与许多能结合SH3的蛋白质相结合,N端则参与细胞膜的内凹形成囊泡。内吞蛋白在神经递质的回收过程中发挥重要的作用,并在细胞的信号转递和凋亡过程中具有重要的作用。

内吞蛋白是近年来发现的一类新的蛋白质,其引人关注的功能是帮助神经介质的回收。最近几年随着神经科学的发展,内吞蛋白的研究逐渐深入,发现有些内吞蛋白并不全是分布在神经组织,它们的功能不仅仅局限于神经介质回收。本文就内吞蛋白近年来的研究进行综述和讨论。

一、基本特性

1. 内吞蛋白的命名

人的内吞蛋白是从一名急性淋巴细胞性白血病患者儿童的标本中克隆的。此病人具有11和19号染色体易位,使该基因与MLL(Mixed lineage leukemia gene)形成融合基因,1997年命名为EEN(Extra Eleven Nineteen)^[1],同时又对2个同源序列分别命名为EEN-B1和EEN-B2,后发现EEN-B1与小鼠SH3P4基因同源,EEN与小鼠SH3P8同源,EEN-B2与小鼠SH3P13同源,由于这类蛋白质主要功能与神经递质的内吞有关,就统一称为内吞蛋白(Endophilin),2002年有人建议命名为A1,A2,A3,因为又发现了一类新的成员,后者分别命名为内吞蛋白B,B1a,和B1b组成内吞蛋白家族。

2. 组织分布

内吞蛋白A1、A2、A3的mRNA表达具有组织特异性^[2],内吞蛋白A1、A3仅表达于脑神经末梢组织和睾丸组织,内吞蛋白A2和B1a则广泛分布,在体内多数组织广泛表达。

二、蛋白质结构特点

1. 基本结构

内吞蛋白具有一个共同的结构特点,在C端含有一个SH3同源序列,N端含有一个溶血磷脂酸脂酰基转移酶(LPAAT, lysophosphatic acyl transferase)的结构域,中央为含有 α 螺旋的序列。以内吞蛋白A2为例^[1],整个分子由368个氨基酸构成,1-130区域为LPAAT的结构域;131-266为C-C(coiled-coil)结构域,内吞蛋白平时以二聚体的形式存在并发挥作用,每分子内吞蛋白通过其C-C结构区相互作用而形成二聚体^[2]。267-303为铰链区;304-368为SH3同源区,该区与一些接头蛋白如Sem-5、Grb2、Drk的SH3结构域类似。

2. 家族成员

内吞蛋白家族成员间蛋白质序列同源性高,内吞蛋白A1-A3之间同源性高达89%^[1],同源性分析见图1,N端LPAAT和C端的SH3结构域比较保守,变异主要存在于铰链区,C-C结构域也有较好的保守性,见图2。

3. 磷酸化位点

以内吞蛋白A2为例,全序列共含有丝氨酸残

*基金项目:国家自然科学基金资助项目(编号:30070183)。

E-mail: xz_wu@shmu.edu.cn

图 1 内吞蛋白家族成员的同源性^[1]

图 2 内吞蛋白 C-C 区的同源性^[3]

基 26 个, 苏氨酸残基 12 个, 酪氨酸残基 8 个。目前已知内吞蛋白 A1 磷酸化以后活性增强^[4,5], 在体外可以被蛋白激酶 A、蛋白激酶 C、钙调蛋白 II、P70S6 激酶、S248 激酶所磷酸化。

三、蛋白质相互作用

除了内吞蛋白的 C-C 结构区可以相互作用而形成二聚体外, 其 C 端有一个具有独特结合功能的 SH3 结构域^[6,7], 因此可以和一些特殊功能的蛋白质相互作用并结合, 从而影响其他蛋白质的功能。目前已经发现的包括如下一些蛋白质: β 1-肾上腺素能受体 (beta1-AR)^[8]; 金属蛋白酶 disintegrins^[9,10], 是一种膜定位的糖蛋白, 具有多种功能, 参与神经再生、造血、受精等过程; disintegrins 的胞浆段含有脯氨酸富含区, 可与内吞蛋白结合; amphiphysin^[11] 是一种神经突触蛋白, 协助突触间隙颗粒回收; GTP 酶 dynamin, 此蛋白既具有内在 GTP 酶活性, 又是

小脑激酶 Dyrk1A 的底物, 具有自身聚集倾向的基本特性, 可以帮助新生的内膜突起囊泡从细胞膜上分离开来^[12]; synaptojanin 目前已知是一种磷酸肌醇磷酸酶, 在细胞内信号转导中有重要作用; synapsin 1; huntingtin 也属于内吞蛋白 A1 的结合蛋白, 但是功能不清, 据认为内吞蛋白 A1 含有 Huntington's 病致病基因外显子 1 的重复谷氨酰胺序列^[11], 可能参与 Huntington's 病的病理过程。

四、细胞内信号传导作用

由于内吞蛋白与多种蛋白质相互作用, 因此涉及细胞内多条细胞信号传导通路。

1. 与细胞膜受体相互作用

内吞蛋白主要分布于细胞浆和细胞膜上, 可以和膜受体的胞浆段相互作用, 而传导信号, 如 β 1-肾上腺素能受体, 内吞蛋白通过与 β 1-肾上腺素能受体的胞浆侧肽链脯氨酸富含区结合, 进而调节该受体

的内吞及和 G 蛋白的结合^[8]。内吞蛋白还可以与 Cbl 和 CIN85 形成复合物,介导细胞膜活化 EGF 受体的内吞,Cbl 是一种多功能接头蛋白,参与膜受体的降解和活化的膜受体信号传递的消除。CIN85 是 Cbl 的结合蛋白。Cbl 可以迅速与 CIN85 及内吞蛋白结合,从而导致 EGF 受体的内吞,及时消除活化 EGF 受体的信号传递效果^[13]。同样这种复合物也调节肝细胞生长因子的内吞^[14]。

2. 参与磷脂信号通路

目前已知内吞蛋白可与 dynamin 及 synaptojanin 结合,dynamin 和磷脂酶 C 通过 pH 结构域又与肌醇 4,5 二磷酸(PIP2)或肌醇 3,4,5 三磷酸(PIP3)结合,从而刺激 dynamin 本身的 GTP 酶活性和在凹陷膜囊泡颈部的聚集^[4],然而 PIP2 是 PI4PK 和 PI5PK 的催化产物,后二酶均受磷脂酸(PA)的激活,PA 还可来于磷脂酶 D 催化磷脂酰胆碱的水解,但是磷脂酶 D 受 synaptojanin 抑制,后者还具有肌醇磷酸酶活性,因此内吞小体形成时伴随着 PIP2 的水解。现在知道内吞蛋白 A 1、3 这方面的作用表现较突出。

3. 激活 JNK(c-jun 氨基端蛋白激酶)

内吞蛋白通过与 JNK 的 PPRPPPPR 序列结合,导致 JNK 的激活^[15],据报道内吞蛋白 A1 是该酶在神经系统中主要的结合蛋白之一。

五、神经递质回收作用

内吞蛋白的主要功能之一是神经介质的回收作用。递质的回收实质上是一种细胞的内吞作用,先由网格蛋白(clathrin)与 AP-2 或 AP-180(adaptor protein)和细胞膜类脂相互作用,聚集在细胞膜的浆侧,造成细胞膜的凹陷,一种具有 GTP 酶活性的 dynamin 聚集和环绕在凹陷膜的周围,并促使其形成颈状,这种内凹并具有颈部的膜结构即为网格蛋白包被的囊泡(clathrin-coated vesicles)。为了研究其形成的过程及其与细胞膜断裂的机制,在体外模拟形成联合会样微泡(synaptic-like microvesicles, SLMVs),Söling 小组在研究时发现内吞蛋白 A1 存在于这种 SLMVs 复合体^[16],证明正是内吞蛋白 A1 驱动了凹陷膜囊泡颈部结构与供体膜之间的断裂,内吞蛋白 A1 N 端的 LPAAT 可催化溶血磷脂酸(LPA)和花生四烯酰辅酶 A 形成磷脂酸(PA),LPA 呈倒锥体型立体结构,PA 呈锥体型,前者结构有利于膜的正向突出变形,后者有利于膜的负向凹

陷变形,正是这种磷脂酸的转变驱动了囊泡和供体膜的断裂,因为磷脂酶 A2(PLA2)的抑制剂可以促进囊泡与供体膜的断裂,PLA2 和 PLAAT 作用正好相反。内吞蛋白突变以后,将严重影响突触颗粒回收机制^[17]。

六、内吞以外的作用

内吞蛋白主要存在于神经末梢,但是内吞蛋白 A2 和 B1a 广泛分布于体内多种组织;而且内吞蛋白 B1 不能与 synaptojanin 1 和 synapsin 1 相互作用^[11],过高表达内吞蛋白 B1 的 SH3 区也不能抑制内吞作用,因此内吞蛋白除了突触介质的回收作用以外,还有其他功能,综合如下:

1. 内吞蛋白 A2 实际上还涉及吸收营养和生长因子及病原体和受体内吞等多种功能,参与多种所谓的膜交通机制^[12,18]。而且内吞蛋白 B1 细胞内定位主要在细胞膜部分,不存在于细胞核和高尔基体,它的功能主要与细胞膜的动力学有关^[11]。

2. 有人运用凋亡相关基因相互作用蛋白(apoptosis related gene 2-interacting protein X, Alix)作为酵母双杂交的诱饵,发现内吞蛋白可以与 Alix 相结合^[19]。如果内吞蛋白缺失,著名的凋亡受体 Fas/CD95 就不能正确地定位于细胞膜上,从而导致细胞凋亡机制受抑制,细胞增殖过旺。

3. 内吞蛋白与白血病基因形成融合基因,MLL 基因在小儿白血病经常发生断裂缺失,其 5' 端具有与细胞生长分化功能有关的编码区,缺失以后就对细胞生长失去调控。内吞蛋白基因可以与缺失的 MLL 基因融合,表达成融合蛋白。但在融合蛋白质中,内吞蛋白的具体功能尚不清楚,有可能与粒、单核细胞性白血病的发病机制有关。另外,参与内吞作用的内吞蛋白在高度分化的神经细胞均位于胞浆中,所以一般都认为内吞蛋白是一种胞浆蛋白,但是,笔者通过特异抗体定位的结果显示 U937 白血病细胞的内吞蛋白主要位于细胞核,在分裂相时位于中间体,然后随着纺锤体移向子细胞,显示内吞蛋白似乎是一种核蛋白,当该细胞分化成熟为单核细胞时,内吞蛋白转位于细胞浆中,外周血单个核细胞中的内吞蛋白可位于细胞核和胞浆,成熟为巨噬细胞后则主要位于细胞浆中(笔者未发表资料)。显示内吞蛋白有可能在未分化的白血病细胞起着核蛋白的功能,设想可能与增殖分化有关,分化成熟后转位到胞浆参与内吞作用。

七、结 语

内吞蛋白由于其特殊的蛋白质结构,C端的SH3结构域可以与许多蛋白质相互作用,也可以参与细胞内的信号转导,目前已知的生物学功能主要涉及神经介质回收以及生物膜运输作用,很多功能尚不清楚,随着进一步的研究,将会发现更多作用。

参 考 文 献

- [1] So, C. W., Caldas, C., Liu, M. M. et al., 1997, *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.*, **94**:2563-2568.
- [2] Ringstad, N., Nemoto, Y., and De Camilli, P., 2001, *J. Biol. Chem.*, **276**:40424-40430.
- [3] Modregger, J., Schmidt, A. A., Ritter, B. et al., 2003, *J. Biol. Chem.*, **278**:4160-4167.
- [4] So, C. W., So, C. K., Cheung, N. et al., 2000, *Leukemia*, **14**:594-601.
- [5] So, C. W., Sham, M. H., Chew, S. L. et al., 2000, *Biochem. J.*, **348** Pt 2:447-458.
- [6] Simpson, F., Hussain, N. K., Qualmann, B. et al., 1999, *Nat. Cell Biol.*, **1**:119-124.
- [7] Gad, H., Ringstad, N., Low, P. et al., 2000, *Neuron*, **27**:301-312.
- [8] Tang, Y., Hu, L. A., Miller, W. E. et al., 1999, *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.*, **96**:12559-12564.
- [9] Howard, L., Nelson, K. K., Maciewicz, R. A. et al., 1999, *J. Biol. Chem.*, **274**:31693-31699.
- [10] Reutens, A. T. and Begley, C. G., 2002, *Int. J. Biochem. Cell Biol.*, **34**:1173-1177.
- [11] Modregger, J., Schmidt, A. A., Ritter, B. et al., 2003, *J. Biol. Chem.*, **278**(6):4160-4167.
- [12] Wiejak, J. and Wyroba, E., 2002, *Cell Mol. Biol. Lett.*, **7**:1073-1080.
- [13] Soubeyran, P., Kowanetz, K., Szymkiewicz, I. et al., 2002, *Nature*, **416**:183-187.
- [14] Petrelli, A., Gilestro, G. F., Lanzardo, S. et al., 2002, *Nature*, **416**:187-190.
- [15] Ramjaun, A. R., Angers, A., Legendre-Guillemain, V. et al., 2001, *J. Biol. Chem.*, **276**:28913-28919.
- [16] Schmidt, A., Wolde, M., Thiele, C. et al., 1999, *Nature*, **401**:133-141.
- [17] Guichet, A., Wucherpfeffig, T., Dudu, V. et al., 2002, *EMBO J.*, **21**:1661-1672.
- [18] Barr, F. A. and Shorter, J., 2000, *Curr. Biol.*, **10**:R141-R144.
- [19] Chatellard-Causse, C., Blot, B., Cristina, N. et al., 2002, *J. Biol. Chem.*, **277**:29108-29115.

Wnt 信号转导途径及其与结肠癌的关联*

孔 氏 白 阳 王敬泽**

(中国科学院动物研究所生物膜与膜工程国家重点实验室 北京 100080)

摘 要 Wnt 信号转导途径参与细胞多种复杂的生化反应过程。目前认为 Wnt 通路的组成主要包括:细胞外因子(Wnt)、跨膜受体 Frizzled(Frz)、 β -连环蛋白(β -catenin)及 T 细胞趋化因子(T cell factor, TCF)等一系列蛋白。细胞外因子 Wnt 激活的信号通过胞质蛋白的相互作用,能够使胞浆内 β -连环蛋白保持稳定并累积, β -连环蛋白进而入核与 T 细胞趋化因子联合作用激活靶基因(多数是参与细胞增殖与凋亡的基因,如:Cyclin D1、c-myc 等)的转录,而且在 Wnt 信号途径的不同阶段有各种蛋白因子进行调控;另外,Wnt 胞内信号途径的异常激活与人类各种癌症的产生有联系,尤其是结肠癌变。大多数结肠癌患者的转化细胞存在 APC(adenomatous polyposis coli)基因缺失突变或失活,导致 β -连环蛋白在核内的累积,并能影响相关基因转录,被认为是结肠癌发生的关键因素之一。由于该信号转导途径具有如此重要的作用,因此受到研究者越来越多的重视。

Wnt 信号转导途径与细胞的发育分化密切相关,而且在许多肿瘤的发生中起重要作用,是近年来国际前沿研究的热点之一。早期对 Wnt 信号途径的探索主要集中在致癌病毒和果蝇(*Drosophila*)发育机制的研究,Nusse 用小鼠乳头瘤病毒(mouse mammary tumor virus, MMTV)诱导小鼠产生乳腺癌,并且发现 MMTV 常整合于宿主染色体的特定

位置,激活该位点基因 Wnt-1^[1],后来发现此基因与果蝇胚胎发育基因 Wingless(Wg)同源,Wg 基因突变将导致成年果蝇无翅;Wnt-1 是 Wnt 基因家族成员之一(已知哺乳动物中 Wnt 成员至少 16 个)^[2]。

* 基金项目:国家自然科学基金资助项目(编号:30171071)。

** 通讯作者。E-mail: wangjz@panda.ioz.ac.cn